

ÜÇ YÖNLÜ LOG-LİNEER MODELLER İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA, ALKOL VE NARGİLE İÇME NEDENLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Zeynep FİLİZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Bu çalışma üniversite öğrencilerinde sigara, alkol ve nargile içme sıklığını belirlemek ve bunları etkileyen risk faktörlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde okuyan 478 öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Log Linear Modeller kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 478 öğrenciden 244'ü (%51) erkektir. Günde içilen sigara sayısı cinsiyet, yaş, barınma şekli ve sigara cinsinden etkilendiği kardeş sayısı ve ailenin sosyal durumundan etkilenmediği bulunmuştur. Alkol kullanım sıklığı barınma şekli ve alkol türünden etkilendiği kardeş sayısı, ailenin sosyal durumu, cinsiyet ve yaştan etkilenmediği ve nargile kullanım sıklığı cinsiyet, yaş ve barınma şeklinden etkilendiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, bir yandan gençlere rol model olacak öğretmen, doktor gibi meslek üyelerinin ve anne babaların bu konuda bilinçlendirilmelerinin sağlanması gerekirken, diğer yandan da bırakma kampanyaları düzenlenerek salgının gerilemesine ve sigara, alkol ve nargile mücadelesine katkıda bulunulmalıdır.

ANAHTAR KELİMELELER

Sigara İçme, Alkol, Nargile, Üniversite Öğrencileri, Log Linear Modeller.